



Herzlich Willkommen zum Likamundi Kongress 2022

Thema: Krankheitsbilder 10 x 10



likamundi.de

Symptomatik:
AIDS

4 S & KAZ

2er Regel

Somatisches
Syndrom

Antriebsverlust
Interessenlosigkeit
Depressive
Stimmung

Suizidalität
Selbstwert
Schuldgefühle,
Schlafstörungen
Konzentrationsstör.
Appetitverlust
Zukunftsgedanken negativ

2 Wo.
2HS+2NS (leicht)
2HS+2NS+2 weitere
(mittel)
+2 weitere, das 3. HS
inklusive (schwer)

Ich mache früh morgens
Pfannkuchen, aber ganz lecker!
Interessenlosigkeit, **M**angelnde
emotionale Reagibilität,
Früherwachen, **M**orgentief,
Psychomot.
Agitiertheit/Hemmung, **A**ppetit-,
Gewichts-, **L**ibidoverlust

Beschreibung:
Phasen

Depression

Therapie:
Antidepressiva
Neuroleptika
Sedativa

Psychotik
möglich!

Gefahren:
Suizidalität

Ursachen:
Multi-
faktoriell

Epidemiologie:
15 – 20%
2:1

Subtypen:
Paranoide,
hebephrene,
katatone Sch.
Residuum

1. Rang:
Ich-Be-
Stimme-Wahn

2. Rang:
Hall-For-Kata-
Ne

1 Monat

Ich-Störungen,
Beinflussungs-
wahn, **Stimmen**,
Bizarrer **Wahn**

Halluzinationen
anderer Sinne,
Formale Denkst.,
Katatone Sympt.,
Negativsymptome

Prognose:
1/3 Regel

Psychose

Schizophrenie

1%
1:1

Neuroleptika
Sedativa

Eigen- &
Fremd-
gefährdung

Multi-
faktoriell

Kognitiver
Abbau

Gedächtnis
Merkfähigkeit
Orientierung

Wesens-
veränderung
(affektiv &
sozial)

Mind.
6 Monate

Chronisch,
progredienter
Verlauf

Demenz

Typen:
Alzheimer,
Vaskuläre,
Sonstige

Verstecken
Defizite!

Nicht heilbar,
verlangsamt.
Therapie

Suizidalität
& Delir

Degenerativ

Verwirrtheits
zustand

Reversibel

Bewusstseins-
trübung

Orientierungs-
störung

Opt. Wahr-
nehmungsstörg

Akut

Delir

Vegetative
Symptome
(F1)

Intensiv-
station

Lebens-
gefahr

Organisch &
Substanzen

ACTEKE

Folgen:
Korsakow

Alkohol-
halluzinose

Wernicke-
Enzephalo-
pathie

Anhaltender Gebrauch
trotz schädli. Folgen,
Craving,
Toleranzentwicklung,
Einengung auf Substanz,
Kontrollverlust,
Entzugssymptome

M:F
3:1

Alkohol- abhängigkeit

Körperliche &
psych.
Abhängigkeit

Sozialer
Abstieg

MEER
(Moti, Entzug,
Entwöhnung,
Reha)

Körperl.
Abbau bis
Suizidalität

Delir

Jump

- Wochenende vom 24. bis 25. September 2022
- Alle prüfungsrelevanten Themen
- Überblick, Struktur
- Kompakte Zusammenfassungen
- Alle Folien und Videoaufzeichnung!
- Du hast es im Griff!

Selbst herbeigeführt

Hungern
Sport
Erbrechen
Abführmittel

Körperschema-
störung

BMI unter
17,5

Amenorrhoe

Magersucht

Anorexie

M:F
1:7

VT,
Gewichtszunahme

Sterblichkeit 15%

Suizid

Vegetative
Symptome

Vermeidungs-
verhalten

Agoraphobie:
MÖRE

Soziale
Phobie:
Bewertungs-
angst

Angst vor:
Menschenmengen,
Öffentliche Plätze,
Reisen allein,
Entfernung von
Zuhause

Spez. Phobien
(Höhe,
Spinnen etc.)

Objekt- bzw.
situationsgeb.
Ängste

Phobien

Angst vor
der Angst

Antidepressiva
begleitend

Systematische
Desensibili-
sierung

Expositions-
training

Eigene
Gedanken

Als unsinnig
erkannt (ich-
dyston)

(Erfolgloser)
Versuch
Widerstand zu
leisten

Bei Unter-
drückung:
Angst

Sich
aufdrängende
Gedanken/
Handlungen

Zwangs- störungen

Mindestens
2 Wochen

Zwangs-
gedanken, -
impulse, -
handlungen

Anti-
depressiva

Exposition mit
Reaktions-
verhinderung

Kontroll-,
Wasch- und
Zählzwang

Betroffen:
Kognition,
Affektivität,
Impulskontr.

Leidensdruck,
persönlich o.
im Umfeld

Andauernd
& stabil

Seit
Kindheit &
Adoleszenz

Persönlichkeit
& Verhaltens-
störung ohne
Hirnschädigung

Persönlichkeits- störungen

Typen
Sonderbar:
(Paranoid &
schizoid)

Dramatisch:
HEND (Histrio-
nisch, Emo,
Narzisst, Dissoz.

Schwer
therapierbar,
begleitend

Komorbidität
& Sucht

Ängstlich: AAA
(Abhängig,
Ängstlich,
Anankastisch)

Zappel-
Philipp

Früher
Beginn,
vor 7. LJ

Unaufmerk-
samkeit

Überaktivität
Hypermotorik

Impulsivität

Hyperkine-
tische Störung

ADHS

Situations-
übergreifend
(Schule &
Zuhause)

Ritalin

Hohe Unfall-
neigung

J:M
5-8:1